

RECIFE 2009



IX Congresso  
Brasileiro  
de Saúde Coletiva

**IESS**

*INSTITUTO DE ESTUDOS  
DE SAÚDE SUPLEMENTAR*

# DIFERENÇAS ASSISTENCIAIS NO PRÉ- NATAL, PARTO E PUERPÉRIO ENTRE MULHERES COM E SEM PLANO DE SAÚDE

Francine Leite  
Carina Burri Martins  
José Cechin

- Introdução
- Objetivo
- Métodos
- Resultados
- Discussão
- Conclusão

- Atenção à saúde materno-infantil: prioritária entre gestores de saúde
- Boa assistência pré-natal: menores riscos de complicações fetal e materna → prevenção
- Assistência adequada ao parto e no puerpério → serviço de melhor qualidade às mulheres e evitar complicações.

- Comparar alguns indicadores de qualidade da assistência prestada de cada fase do ciclo de gravidez entre o sistema público de saúde e o serviço prestado pelos planos de saúde
  - Assistência pré-natal: consultas
  - Assistência ao parto: tipo de parto, acompanhamento, procedimentos (tricotomia, episiotomia, lavagem intestinal), alívio da dor
  - Assistência ao puerpério: consulta pós-parto

## *Métodos –Base de dados*

---

- Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS 2006) → banco de dados disponível no site do Ministério da Saúde
  - traça um perfil da população feminina em idade fértil e das crianças menores de cinco anos no Brasil
- Coordenação: Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento)
- Financiamento: Ministério da Saúde

## *Métodos – população de estudo*

---

- População de estudo:
  - Mulheres de 15 a 49 anos de idade e seus filhos menores de 5 anos
- Amostra:
  - Representatividade nacional, 5 macrorregiões, urbano-rural
  - 14.617 domicílios
  - 15.575 mulheres entrevistadas
  - 5.056 crianças menores de 5 anos (4.957 vivas no momento da entrevista)
  - Modelo estratificado de conglomerados aleatório simples em 2 etapas:
    - 1<sup>a</sup>. Etapa: sorteio aleatório dos conglomerados – setores
    - 2<sup>a</sup>. Etapa: sorteio dos domicílios

- Análise

- Mulheres com plano x Mulheres sem plano

- Análise descritiva – proporções

- Peso amostral

## *Métodos – variáveis analisadas*

---


- **Assistência pré-natal:**
  - Cobertura
  - Número de consultas
  - Período gestacional de primeira e última consulta
- **Assistência ao parto**
  - Tipo de parto
  - Realização de procedimentos: episiotomia, tricotomia, lavagem intestinal
  - Alívio da dor no parto (somente para parto normal)
    - Realização de procedimento
    - Tipo de procedimento, se realizado
- **Assistência ao puerpério**
  - Realização de consulta ginecológica após o parto (2 meses)



## ➤ Cobertura pré-natal

**Figura 1:** Taxa de cobertura pré-natal das crianças de até 5 anos por região, PNDS 2006.


n=146  
➤ Distância  
(N e NE)  
  
➤ Tempo  
(S e SE)



Fonte: PNDS 2006/MS. Elaboração: IESS

## ➤ Cobertura pré-natal por planos de saúde (Regiões)

**Figura 2:** Percentual de pré-natal realizado por pelo plano de saúde, por região. Brasil, PNDS 2006.



Fonte: PNDS 2006/MS. Elaboração: IESS

# Resultados – Descrição sociodemográfica

Tabela 1: Características sócio-demográficas e de assistência pré-natal segundo cobertura de plano de saúde por região geográfica. Brasil, PNDS 2006.

	Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
<b>Idade (parto)</b>										
15-19	5,2	27,1	0,6	27,1	8,6	21,2	6,6	24,6	2,7	23,8
20-24	24,0	36,2	38,8	34,5	25,5	29,9	23,2	29,3	21,7	38,2
25-29	27,0	22,9	40,4	21,6	35,3	20,9	25,8	20,5	36,6	19,1
30-34	27,0	9,8	16,1	10,9	15,6	17,2	20,8	15,2	18,8	12,2
≥35	16,8	4,0	4,1	5,8	15,0	10,8	23,6	10,4	20,2	6,8
93 informações ignoradas										
<b>Escolaridade</b>										
Nunca frequentou	0,0	1,5	0,0	3,3	0,3	0,9	0,0	1,4	0,0	2,6
1 a 4	2,5	28,7	1,0	25,2	4,4	16,5	1,2	19,7	0,3	13,6
5 a 8	8,8	35,0	15,4	34,6	18,9	43,8	26,0	43,0	22,8	39,6
≥9	88,8	34,9	83,6	36,9	76,4	38,8	72,8	35,9	76,9	44,2
36 informações ignoradas										
<b>Renda per capita (SM) familiar</b>										
<0,25	14,6	50,1	5,8	50,0	4,2	21,2	0,8	17,2	5,4	22,4
0,25-0,49	14,8	24,6	12,1	33,8	10,0	32,6	9,5	32,9	9,8	36,4
0,50-0,74	7,6	12,6	20,2	7,3	19,0	20,0	17,9	21,5	16,8	17,8
0,75-1,00	6,8	4,0	21,8	2,7	17,4	8,5	13,1	10,5	3,0	10,3
>1,00	56,2	8,7	40,1	6,2	49,4	17,7	58,7	17,9	65,0	13,1
875 informações ignoradas										

Fonte: PNDS 2006/MS. Elaboração: IESS

# Resultados – Assistência pré-natal

**Tabela 2:** Distribuição das características da assistência pré-natal entre as mulheres com e sem plano de saúde. Brasil, PNDS 2006.

	Com Plano (%)	Sem plano (%)
<b>Primeira consulta pré-natal</b>		
Antes dos 3 meses	80,9	57,6
Entre 3 e 5 meses	17,2	37,5
A partir dos 6 meses	1,7	3,4
Não sabe/Não respondeu	0,2	1,5
0 ignoradas		
<b>Última consulta pré-natal</b>		
Antes dos 7 meses	0,7	2,3
Entre 7 e 8 meses	24,3	30,2
Entre 9 e 10 meses	74,1	66,3
Não sabe/não respondeu	0,9	1,2
<b>Quantas consultas pré-natal</b>		
≤3	1,3	5,0
4 a 5	2,0	9,8
≥6	96,7	85,2
283 ignoradas		

Fonte: PNDS 2006/MS. Elaboração: IESS

## Resultados - Assistência ao parto

**Tabela 3:** Distribuição das características de assistência ao parto entre as mulheres com e sem plano de saúde. Brasil, PNDS 2006.

	Com plano	Sem plano
<b>Tipo de parto</b>		
Cesárea	78,8	33,6
Normal	21,2	66,4
<b>Acompanhante durante o parto</b>		
Sim	37,6	10,1
Não	62,4	89,8
Não sabe/Não respondeu/Não se aplica	0,0	0,1
<b>Realização de episiotomia (parto normal)</b>		
Sim	81,6	71,4
Não	18,4	26,9
Não sabe/Não respondeu/Não se aplica	0,0	1,7
<b>Realização de tricotomia</b>		
Sim	51,6	35,1
Não	48,0	64,4
Não sabe/Não respondeu/Não se aplica	0,4	0,5
<b>Lavagem Intestinal</b>		
Sim	23,6	22,4
Não	74,0	76,1
Não sabe/Não respondeu/Não se aplica	2,4	1,5

Fonte: PNDS 2006/MS. Elaboração: IESS

## *Resultados – Alívio da dor no parto*

- n = 2.379: 28,5% com alívio
  - Com plano: 48,3%
  - Sem plano: 27,2%

Tabela 4 : Distribuição dos procedimentos para alívio da dor entre as mulheres com e sem plano de saúde que tiveram parto normal. Brasil, PNDS 2006.

	Com plano	Sem plano	Geral
<b>Anestesia geral</b>	10,3	5,9	6,4
<b>Anestesia peridural</b>	36,7	11,9	14,4
<b>Anestesia local</b>	34,2	52,7	50,9
<b>Outro medicamento</b>	13,8	20,7	20,0
<b>Massagem</b>	0,0	1,4	1,3
<b>Banho morno</b>	10,7	0,1	1,2
<b>Não lembra</b>	0,0	7,8	7,0

Fonte: PNDS 2006/MS. Elaboração: IESS

- Consulta ginecológica até 2 meses pós-parto
  - 38,5%
    - Com plano: 70,3%
    - Sem plano: 32,2%

A qualidade de assistência à mulher desde o pré-natal até o puerpério é, em geral, superior entre as beneficiárias de plano de saúde em relação a das não usuárias. Essa melhor assistência decorre da maior facilidade de acesso aos serviços, do atendimento com hora marcada e pelo mesmo médico durante todo o período. Esses fatores podem ser vantajosos para a adesão ao pré-natal e segurança no momento do parto, fatores que são diferenciais do sistema por plano de saúde.



# OBRIGADA

Instituto de Estudos de Saúde Suplementar

[www.iess.org.br](http://www.iess.org.br)

→ Textos de discussão

Contato:

55 11 37069747

[francine.leite@iess.org.br](mailto:francine.leite@iess.org.br)